

DermaBlue™ + Foam

ANTIMICROBIAL FOAM WOUND DRESSING WITH METHYLENE BLUE, GENTIAN VIOLET, AND SILVER

APÓSITO ANTIMICROBIANO DE ESPUMA PARA HERIDAS CON AZUL DE METILENO, VIOLETA DE GENCIANA Y PLATA

For the management of exuding wounds

Para el tratamiento de heridas exudativas

DESCRIPTION

DermaBlue+ Foam Wound Dressing is made of polyurethane/polyether foam, Methylene Blue (up to 0.25 mg/g), Gentian Violet (up to 0.25 mg/g), and Silver Sodium Zirconium Phosphate (up to 7 mg/g). The 3 ingredients provide broad spectrum antimicrobial protection within the dressing.

INDICATIONS FOR USE

DermaBlue+ Foam is indicated for moderately to heavily exuding, partial to full thickness wounds, including: pressure ulcers, leg ulcers, diabetic foot ulcers, graft wounds and donor sites, skin tears, first and second degree burns, surgical wounds, lacerations and abrasions.

CONTRAINDICATIONS

DermaBlue+ Foam should not be used on patients with a known sensitivity to silver or any other contents of the dressing. Not indicated for third-degree burns.

DIRECTIONS (Use under the guidance of a qualified healthcare professional.)

PREPARE WOUND SITE AND SURROUNDING SKIN:

1. Cleanse wound to remove residue according to local infection control protocol.
2. Skin around wound should be clean and dry, use skin barrier prep as needed.

TO APPLY:

1. Remove dressing from package.
2. Dressing may be cut to size prior to application. Dressing may be rolled or layered to lightly pack into wound.
3. Apply dressing directly to wound. Direct contact with entire wound bed is necessary for best results.
4. Secure with tape or appropriate cover dressing that manages drainage and maintains a moist wound environment.

CHANGING THE DRESSING:

- Dressing may be left in place for up to 3 days or as directed by a qualified healthcare professional.
- Change the dressing if drainage shows through the back of the cover dressing; or if the edge of the cover dressing becomes loose; or if the condition of the wound or surrounding skin causes concern; or as directed by a qualified healthcare professional.
- Dressing may be moistened to ease removal.
- Carefully remove adhesive secondary dressings by holding the edge of the dressing and slowly pulling it parallel to the skin.
- Dispose of in accordance with local guidance.


WARNINGS

- For single use only.
- If signs of infection are detected, a qualified healthcare professional should be contacted to decide on the next course of action.
- If signs of an allergic reaction are detected, discontinue use of the product and seek advice from a qualified healthcare professional.
- Product is sterile unless the package is opened or damaged. Do not resterilize.

OTHER INFORMATION

- Store in a dry place at room temperature.
- Keep away from sunlight.
- Not made with natural rubber latex.

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician (or properly licensed healthcare practitioner).

DEPTH / STAGE	ABSORBENCY
PARTIAL FULL 1 2 3 4	 HIGH
For Partial and Full thickness wounds / Pressure ulcers stages 2-4	

DermaRite®

DermaBlue™ + Foam

ANTIMICROBIAL FOAM WOUND DRESSING WITH METHYLENE BLUE, GENTIAN VIOLET, AND SILVER

APÓSITO ANTIMICROBIANO DE ESPUMA PARA HERIDAS CON AZUL DE METILENO, VIOLETA DE GENCIANA Y PLATA

For the management of exuding wounds

Para el tratamiento de heridas exudativas

DESCRIPCIÓN

El Apósito de Espuma para Heridas DermaBlue+ está hecho de espuma de poliuretano/políéter, azul de metileno (hasta 0,25 mg/g), violeta de genciana (hasta 0,25 mg/g) y fosfato de circonio y plata sódica (hasta 7 mg/g). Los 3 ingredientes proporcionan un amplio espectro de protección antimicrobiana dentro del apósito.

INDICACIONES DE USO

La Espuma DermaBlue+ está indicada para heridas de exudación moderada a fuerte, de espesor parcial a total, incluyendo: úlceras por presión, úlceras de pierna, úlceras de pie diabético, heridas de injerto y zona donante, desgarros de piel, quemaduras de primer y segundo grado, heridas quirúrgicas, laceraciones y abrasiones.

CONTRAINDICACIONES

La Espuma DermaBlue+ no debe usarse en pacientes con sensibilidad conocida a la plata o a cualquier otro contenido del apósito. No está indicado para quemaduras de tercer grado.

INDICACIONES (Usar bajo la guía de un profesional de la salud calificado.)

PREPARAR EL LUGAR DE LA HERIDA Y LA PIEL CIRCUNDANTE:

1. Limpie la herida para eliminar los residuos de acuerdo con el protocolo local de control de infecciones.
2. La piel alrededor de la herida debe estar limpia y seca, utilice una preparación de barrera cutánea según sea necesario.

PARA APLICAR:

1. Retire el apósito del paquete.
2. El apósito puede ser cortado a medida antes de la aplicación. El apósito puede enrollarse o colocarse en capas para que quede ligeramente adherido a la herida.
3. Aplique el apósito directamente sobre la herida. El contacto directo con todo el lecho de la herida es necesario para obtener los mejores resultados.

PROFUNDIDAD / ETAPA	CAPACIDAD DE ABSORCIÓN
PARCIAL TOTAL	
1 2 3 4	ALTA
Para heridas de grosor parcial y total / Úlceras por presión etapas 2-4	

4. Asegúrelo con cinta adhesiva o un apósito protector apropiado que controle el drenaje y mantenga el ambiente húmedo de la herida.

CAMBIANDO EL APÓSITO:

- El apósito puede dejarse en su lugar hasta por 3 días o según las instrucciones de un profesional de la salud calificado.
- Cambie el apósito si el drenaje se ve a través de la parte posterior del apósito protector; o si el borde del apósito protector se afloja; o si la condición de la herida o de la piel circundante causa preocupación; o según lo indique un profesional de la salud calificado.
- El apósito puede humedecerse para facilitar su remoción.
- Retire con cuidado los apósitos secundarios adhesivos sosteniendo el borde del apósito y tirando lentamente de él paralelamente a la piel.

ADVERTENCIAS

- Para un solo uso.
- Si se detectan signos de infección, se debe contactar a un profesional de la salud calificado para decidir sobre la manera de proceder.
- Si se detectan signos de una reacción alérgica, interrumpa el uso del producto y consulte a un profesional de la salud calificado.
- El producto es estéril a menos que el paquete esté abierto o dañado. No vuelva a esterilizar.

OTRA INFORMACIÓN

- Conservar en un lugar seco y a temperatura ambiente.
- Mantener alejado de la luz solar.
- No está hecho con látex de caucho natural.

Precaución: La ley federal (EE.UU.) permite la venta de este dispositivo únicamente a través de un médico (o de un profesional de la salud debidamente autorizado)

DermaRite®